

Autores: Gingold RN<sup>1</sup>, Pimentel PHP<sup>1</sup>, Arantes FEFP<sup>1</sup>, Lopes GJ<sup>1</sup>, Rocha PMB<sup>2</sup>.

## Introdução

Mania: 1ária ou 2ária (induzida por substâncias ou condições clínicas).

Raros relatos na literatura científica  $\simeq$  :

**Hepatopata, HPP (-) p/ (hipo)mania**

\- - - > síndrome **maníaca**

(durante/após)

**encefalopatia hepática**

## Relato do Caso

N.A.T., ♀, 59 anos, parda, 12a de escolaridade, dona de casa, cirrótica por **hepatopatia** crônica criptogênica (pesquisa de sorologias e autoanticorpos negativa), c/ HF (+) p/ casos quadros hepáticos  $\simeq$ , mas (-) p/ **transtornos mentais quaisquer**.

Refratária a tratamentos prévios (anos antes) c/ corticoterapia e azatioprina, aguardava Tx hepático. Foi internada em 28/09/23 por descompensação edemato-ascítica do quadro de base. Em 12/10/22, a interconsulta psiquiátrica foi acionada em função de alterações compor-

1. Residente (R3) de Psiquiatria 2. Psiquiatra e Preceptor (todos: **HC-UFMG**)

tamentais *atípicas* para uma síndrome de encefalopatia hepática:

**hipertimia oscilando com disforia, grandiosidade, desinibição, pressão por falar, taquipsiquismo e fuga de ideias.**

Investigada por entrevista direta e com acompanhantes, foi relatada história pregressa apenas de episódios **depressivos**, sem sintomas psicóticos, estando em uso de **sertralina 50 mg** no início da internação (negando uso recente de outras substâncias psicoativas).

Suspendemos a medicação, e aguardamos os tempos de meia-vida da medicação e de seus metabólitos ativos, sendo, em paralelo, reposta **tiamina IM** (por suspeita de encefalopatia de Wernicke, em vista do estado desnutrido).

A síndrome maniforme se manteve, sendo acrescida de **redução da necessidade de sono** e **persecutoriedade** com cuidadora. No D44 da internação pontuou **34/60 na Young Mania Rating Scale** (VR: 26-37 = mania **moderada**).

Foi iniciada e progredida **Quetiapina** até a alta hospitalar, já transplantada, em melhora parcial dos sintomas supracitados. Ambulatorialmente, teve remissão completa, mantida mesmo após a suspensão da medicação.